



Patiënteninformatie

Leverbiopsie

Inhoud

Inleiding.....	3
Doel van het onderzoek.....	3
Vorbereiding op het onderzoek.....	3
Verloop van het onderzoek.....	4
Na het onderzoek.....	4
Mogelijke verwikkelingen	4
Desinfectie	5
Uitslag	5
Tot slot	5
Wie contacteren bij vragen / problemen?	5
Persoonlijke notities/ vragen	6

**Meer info over de dienst maag-, darm- en leverziekten op
www.maagdarmturnhout.be**

Inleiding

In deze brochure vindt u informatie over het verloop van een leverbiopsie (leverpunctie).

Wij vragen u deze folder aandachtig te lezen. Zo krijgt u een beter inzicht in het onderzoek en kunt u ons ook verwittigen indien u denkt een risicopatiënt te zijn.

Doel van het onderzoek

Momenteel kan men in geval van een leveraandoening vaak tot een diagnose komen aan de hand van een bloedanalyse, echografie, CT-scan, MRI, ...

Soms is echter bijkomende informatie van het leverweefsel zelf noodzakelijk om de diagnose te stellen of om de oorzaak van de leverziekte te achterhalen of om een idee te hebben over de ernst of de evolutie van bepaalde leveraandoeningen.

Met een leverbiopsie wordt er een klein stukje van de lever genomen voor verder microscopisch onderzoek.

Vorbereiding op het onderzoek

- Breng uw medicatielijst mee.
- U dient nuchter te zijn: dat wil zeggen dat u vanaf middernacht niets meer mag eten en drinken. Ook het innemen van medicijnen moet tot na het onderzoek worden uitgesteld.
- Vóór het onderzoek zelf wordt een beetje bloed afgenomen om de bloedstolling te controleren.
- Eerst wordt met een echografietoestel naar de lever gekeken. Zo kan een correcte punctieplaats worden aangeduid op de huid met een stift.
- Breng ons op de hoogte indien u allergisch bent voor bepaalde medicatie.
- Breng ons op de hoogte indien u stollingsproblemen heeft of bloedverdunnende medicatie inneemt (zoals bv. Aspirine, Aggrenox, Plavix, Clopidogrel, Ticlid, Brilique, Marevan, Marcoumar, Sintrom, Pradaxa, Xarelto, Efient, Fraxiparine,

Clexane, Fraxodi, Eliquis...). Bloedverdunnende medicatie zal in bepaalde gevallen in overleg met uw arts gestopt worden. Bij twijfel kunt u steeds uw huisarts contacteren.

- Indien u diabetespatiënt bent en insuline gebruikt, dient er in overleg met de arts beslist te worden wanneer u insuline moet toedienen en welke dosis. Als u enkel diabetestabletten gebruikt, mag u deze 's morgens niet innemen.

Verloop van het onderzoek

Voor het onderzoek zal de arts samen met u een controlelijst overlopen.

De huid wordt lokaal verdoofd, zodat het onderzoek u niet te veel ongemakken bezorgd. Er wordt een kleine snede in de huid gemaakt. Met een fijne naald wordt een klein staaltje leverweefsel afgenomen dat verder onderzocht wordt onder de microscoop.

Het totale onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek

Na de punctie moet u 2 uur op de rechterzijde liggen: zo beperkt u het risico op bloeding uit de punctieplaats. Daarna is bedrust gedurende ongeveer 2 uur noodzakelijk. Dit betekent dat u ook om te eten en voor andere noodzakelijkheden in bed moet blijven.

Soms ervaart u wat pijn ter hoogte van de punctieplaats of de rechterschouder. Dit is normaal en meestal volstaat een klassieke pijnstiller zoals paracetamol.

De arts die het onderzoek uitgevoerd heeft, komt na het onderzoek bij u op de kamer in het dagziekenhuis en zal u vertellen wanneer u het ziekenhuis mag verlaten.

Mogelijke verwikkelingen

Een leverbiopsie is een veilig onderzoek. Verwikkelingen komen gelukkig slechts zeer zelden voor.

Het belangrijkste risico is het optreden van een bloeding: de kans is ongeveer 1 op 100 dat de bloeding niet stelpt ondanks de zijligging. Zeer zelden is dan een chirurgische ingreep nodig om de bloeding te dichtten. Andere verwikkelingen zijn nog zeldzamer, zoals reactie op de lokale verdoving of aanprikken van een galweg of galblaas met ontstaan van gallek en andere verwikkelingen.

Indien u verdere informatie wenst of vragen heeft, kunt u steeds terecht bij uw behandelende arts.

Desinfectie

De biopsies worden enkel met steriel wegwerpmateriaal uitgevoerd (= 'single-use' materiaal).

Uitslag

De uitslag van een leverbiopsie duurt ongeveer 1 week en zal opgestuurd worden naar de aanvragende arts.

Tot slot

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen van de dienst gastro enterologie. Wij hopen van harte dat deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van een leverbiopsie (leverpunctie).

Wie contacteren bij vragen / problemen?

Dienst gastro enterologie (maag-, darm- en leverziekten)
Campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44
2300 Turnhout

www.maagdarmturnhout.be

Van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 17 uur op het nummer 014 44 44 40 (secretariaat maag-, darm- en leverziekten).

Buiten deze uren kunt u u in geval van nood contact nemen met de telefooncentrale van het ziekenhuis op het nummer 014 40 60 11.

Persoonlijke notities/ vragen

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11